

Nurses Phone: (615) 848-9265 ext 140 **Email:** nurses@midtnent.com
Surgery Schedulers' Phone: (615) 848-9265 ext 160 **Email:** surgery@midtnent.com

Timpanostomía es la inserción de un pequeño tubo dentro del tímpano, con el fin de prevenir la acumulación de líquido y equilibrar la presión en ambos lados del tímpano. Los tubos pueden usarse si la acumulación de líquido en el oído medio está causando pérdida de la audición o si un niño tiene infecciones frecuentes en el oído.

- **Un tubo de succión** retira suavemente el líquido del oído por una pequeña incisión en el tímpano.
- **Se coloca un tubito en la incisión del tímpano** que permite que la presión se equilibre y evita que se acumule el líquido de nuevo.
- **La mayoría de los tubos se caen solos 6 a 12 meses** después y la incisión se cierra. Algunos tubos se dejan por más tiempo o deben ser retirados por el médico.

Después de la inserción de tubos auditivos

- **Dolor:** La mayor parte de los pacientes sienten poco o ningún dolor después de la inserción de los tubos.
- **Agua:** No se deje el agua en los oídos después de la cirugía. Usted debe usar tapones para los oídos cada vez que su niño se baña o va a nadar. Por favor, pregunte a su médico o farmacéutico acerca de tapones para los oídos.
- **Medicamentos:** Dele sólo los medicamentos indicados por el médico. Siga cuidadosamente las instrucciones. No le dé al niño ibuprofeno ni aspirina durante 2 semanas después de la operación.
- **Seguimiento:** Los tubos se desprenden por sí solos, sin dolor, y los orificios suelen cicatrizar sin ayuda.
- **Problemas futuros:** Si la audición vuelve a disminuir o las infecciones de oído no cesan, podría ser necesario repetir la cirugía.

Cuándo llamar al médico

Después de la operación son normales las molestias, el dolor leve, y un poco de fiebre, pero llame a su médico si su niño tiene algo de lo siguiente:

- Fiebre por encima de 101°F (38°C)
- Dolor fuerte que no se calma con las medicinas recetadas
- Sangrado de color rojo brillante
- Secreción pegajosa, descolorida o sanguinolenta por el oído, después de las primeras 48 horas de la operación de los tubos.